

LSVT loud

L'LSVT loud è un metodo di allenamento della voce che ha come obiettivo di aiutare il paziente ad utilizzare un volume più alto "abituamente" nella propria comunicazione e che la cosa permanga a lungo.

E' un metodo intensivo e impegnativo ma i suoi risultati durano anche 2 anni dopo la fine del trattamento!!!!

Si può intervenire in qualsiasi stadio della malattia.

Praticando gli esercizi si ottengono miglioramenti nella velocità e l'intelligibilità del linguaggio, nella qualità della voce e le espressioni facciali e si riducono la raucedine e la difficoltà di deglutizione e la disfagia!



Mi contatti per informazioni e valutazione:

Dott.ssa Flora Papadopoulou
Logopedista

391 1074030

flora.logopedista@gmail.com
www.florapapadopoulou.it

Dove mi trovi

Via Torino 30/B, Arbizzano di Negrar (VR) Poliambulatorio D'Aloja


Sedute a domicilio a Verona e dintorni



Parkinson & Logopedia

Parkinson

Il Parkinson è una malattia neurodegenerativa, più comune negli anziani, e viene riconosciuta al suo esordio dai sintomi motori quali tremore, rigidità muscolare, bradicinesia e instabilità posturale. Nella sua progressione la malattia può portare a problemi cognitivi e comportamentali oltre a problemi nel linguaggio, nella comunicazione e nella deglutizione.



Tremore

Postura inclinata

Mimica facciale
a maschera

Braccia e
polso flessi

Tremori
negli arti

Rigidità

Busto e
ginocchia
flesse

La Logopedia nel Parkinson

L'alterazione dei movimenti motori comporta una serie di problemi di interesse logopedico.

L'89% dei pazienti con morbo di Parkinson presenta problemi nella voce e questa percentuale tende ad aumentare.

Nel Parkinson progressivamente la voce del paziente cambia, diventa rauca, monotona, si indebolisce. L'articolazione risulta più difficoltosa, il linguaggio diventa incomprensibile. La persona può avere un modo veloce di parlare o un'involontaria esitazione prima di parlare e ripetizioni incontrollate.

La difficoltà o la mancanza di comunicazione porta ad un isolamento sociale ed alla depressione.

Anche la deglutizione viene compromessa.

La disfagia è presente nel 95% delle persone affette dal morbo di Parkinson con gravi rischi per la loro vita (la disfagia è spesso associata a pneumonie).

Qualsiasi sia il trattamento medico scelto (farmacologico o chirurgico) la logopedia può aiutare il paziente a rallentare il progresso della malattia ed attenuare i sintomi.

Si può scegliere tra un trattamento logopedico classico con esercizi di respirazione, articolazione e prassie oppure un trattamento con il metodo rivoluzionario LSVT loud.